

附件 1

古代经典名方关键信息表（“旋覆代赭汤”等 43 首方剂）

（一）旋覆代赭汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 （汉·张仲景）	旋覆花三两，人参二两，生姜五两，代赭一两，甘草三两（炙），半夏半升（洗），大枣十二枚（擘）。上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煎取三升，温服一升，日三服。	旋覆花	菊科植物旋覆花 <i>Inula japonica</i> Thunb. 或 欧亚旋覆花 <i>Inula britannica</i> L. 的干燥头状花序	生品	41.40g	上七味，以水 2000mL，煮取 1200mL，去药渣，再煎煮至 600mL。每次温服 200mL，日三服。	【功效】降逆化痰，益气和胃。 【主治】胃气亏虚，痰阻气逆证。症见胃脘痞闷或胀满，按之不痛，频频嗳气；或见纳差、呃逆、恶心，甚或呕吐。舌淡，苔白滑或腻，脉弦滑或缓。
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	生品	69.00g		
		赭石	氧化物类矿物刚玉族赤铁矿，主含三氧化二铁（Fe ₂ O ₃ ）	生品	13.80g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	41.40g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎	清半夏	34.50g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	36.00g		

备注	<p>1.据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”“日三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：旋覆花 13.80g，人参 9.20g，生姜 23.00g，赭石 4.60g，炒甘草 13.80g，清半夏 11.50g，大枣 12.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>2.炒甘草：参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p>
----	---

(二) 吴茱萸汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	吴茱萸一升(洗), 人参三两, 生姜六两 (切), 大枣十二枚 (擘)。上四味, 以 水七升, 煮取二升, 去滓, 温服七合, 日 三服。	吴茱萸	芸香科植物吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.、石虎 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>officinalis</i> (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>bodinieri</i> (Dode) Huang 的干燥近成熟果实	汤洗 吴茱萸	69.00g	上四味, 以水 1400mL, 煮取 400mL, 去药渣, 温服 140mL, 日 三服。	【功效】温中补虚, 降逆止呕。 【主治】肝胃虚寒, 浊阴上逆证。症见 食后泛泛欲呕, 或 呕吐酸水, 或干呕, 或吐清涎冷沫, 胸 满脘痛, 巅顶头痛, 畏寒肢冷, 甚则伴 手足逆冷、烦躁不 宁, 舌淡苔白或白 腻, 脉沉细弦紧或 迟而缓弱。
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	生品	82.80g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	36.00g		
备注	<p>1. 据原方中煎煮法“煮取二升, 温服七合”, 可知本方每服量约为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为: 汤洗吴茱萸 23.00g, 人参 13.80g, 生姜 27.60g, 大枣 12.00g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点, 日服用次数建议 1-3 次, 根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算, 若与当今主流用量严重不符, 在固定原方比例和每服量的基础上, 结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>2. 汤洗吴茱萸: 建议参考 2007 年版《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》收录的“生吴茱萸”相关炮制方法, 即“除去杂质, 投入沸水中浸二分钟, 捞出, 晒干”。</p>						

(三) 猪苓汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	猪苓(去皮)、茯苓、泽泻、阿胶、滑石(碎)各一两。上五味,以水四升,先煮四味,取二升,去滓,内阿胶烱消,温服七合,日三服。	猪苓	多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries 的干燥菌核	生品	13.80g	上五味,以水800mL,先煮猪苓、茯苓、泽泻、滑石四味至400mL,去药渣,内阿胶13.80g烱尽,每次温服140mL,日三服。	【功效】利水渗湿,清热养阴。 【主治】水热互结阴伤证。症见小便不利,发热,口渴欲饮,或心烦不寐,或咳嗽,或呕恶,或下利,舌红苔白或微黄,脉浮或细数。亦治热淋、血淋。
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	13.80g		
		泽泻	泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientate</i> (Sam.) Juzep. 或泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn. 的干燥块茎	生品	13.80g		
		阿胶	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L. 的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶	生品	13.80g		
		滑石	硅酸盐类矿物滑石族滑石,主含含水硅酸镁[Mg ₃ (Si ₄ O ₁₀)(OH) ₂]	生品	13.80g		
备注	据原方中煎煮法“取二升”“温服七合”,可知本方每服量约为煎出总量的1/3。故本方每次的服药量为:猪苓4.60g,茯苓4.60g,阿胶4.60g,泽泻4.60g,滑石4.60g,日服3次。						

(四) 甘草泻心汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	甘草四两(炙), 黄芩三两, 干姜三两, 大枣十二枚(擘), 半夏半升(洗), 黄连一两。上六味, 以水一斗, 煮取六升, 去滓, 再煎取三升, 温服一升, 日三服。	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	55.20g	上六味, 以水2000mL, 煮取1200mL, 去药渣, 再浓缩至600mL, 温服200mL, 日三服。	【功效】益气 and 胃, 消痞止利。 【主治】胃气虚弱之痞证。症见心下痞硬而满, 下利日数十行, 水谷不化, 腹中雷鸣, 干呕, 心烦不得安, 舌质淡或红, 舌苔薄白或薄黄, 脉沉细或弦滑。亦治狐惑病。
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	41.40g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的干燥根茎	生品	41.40g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	36.00g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	清半夏	34.50g		
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao、云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎	生品	13.80g		
备注	<p>1.据原方中煎煮法“煎取三升, 温服一升”, 可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为: 炒甘草 18.40g, 黄芩 13.80g, 干姜 13.80g, 大枣 12.00g, 清半夏 11.50g, 黄连 4.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点, 日服用次数建议 1-3 次, 根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算, 若与当今主流用量严重不符, 在固定原方比例和每服量的基础上, 结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>2.炒甘草: 参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法, 建议将甘草原药材除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 趁湿清炒, 炒至微黄, 干燥。</p>						

(五) 黄连汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	黄连三两，甘草三两（炙），干姜三两，桂枝三两（去皮），人参二两，半夏半升（洗），大枣十二枚（擘）。上七味，以水一斗，煮取六升，去滓，温服，昼三服夜二服。	黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao、云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎	生品	41.40g	上七味，以水2000mL，煮取1200mL，去药渣，温服。日三服、夜二服。	【功效】清上温下，和胃降逆。 【主治】上热下寒证。症见胸中烦闷，腹痛，或呕吐，恶心，或肠鸣泄利，舌苔白滑，脉弦者。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	41.40g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的干燥根茎	生品	41.40g		
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	41.40g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	清半夏	34.50g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	36.00g		
备注	<p>1.据原方中煎煮法“煮取六升”“昼三夜二”，可知本方每服量为煎出总量的 1/5。故本方每次的服药量为：黄连 8.28g、炒甘草 8.28g、干姜 8.28g、桂枝 8.28g、人参 5.52g、清半夏 6.90g、大枣 7.20g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-5 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p> <p>2.炒甘草：参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p>						

(六) 附子汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒论》 (汉·张仲景)	附子二枚(炮, 去皮, 破八片), 茯苓三两, 人参二两, 白术四两, 芍药三两。上五味, 以水八升, 煮取三升, 去滓, 温服一升, 日三服。	附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 子根的加工品	黑顺片	30.00g	上五味, 以水1600mL 煎煮, 煮取 600mL, 去药渣, 温服 200mL, 日三服。	【功效】温经助阳, 散寒祛湿。 【主治】阳虚寒湿内停证。症见身体骨节疼痛, 手足不温, 背恶寒, 纳差, 口中和, 大便稀溏, 神疲乏力, 舌淡苔白滑, 脉沉微或细。
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	41.40g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	55.20g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	41.40g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升”“日三服”, 可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为: 黑顺片 10.00g, 茯苓 13.80g, 人参 9.20g, 白术 18.40g, 白芍 13.80g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点, 日服用次数建议 1-3 次, 根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算, 若与当今主流用量严重不符, 在固定原方比例和每服量的基础上, 结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(七) 泽泻汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匮要略》(汉·张仲景)	泽泻五两，白术二两。上二味，以水二升，煮取一升，分温再服。	泽泻	泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientate</i> (Sam.) Juzep.或泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn.的干燥块茎	生品	69.00g	上两味，用水400mL，煮取约200mL，分两次温服。	【功效】利水健脾除饮。 【主治】水饮上犯之眩晕。症见头目眩晕，胸中痞满，咳逆倚息，舌质淡胖，苔白滑，脉沉弦。
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎	生品	27.60g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取一升”“分温再服”，可知本方每服量为煎出总量的1/2。故本方每次的服药量为：泽泻 34.50g、白术 13.80g，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1-2次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(八) 橘皮竹茹汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》 (汉·张仲景)	橘皮二升，竹茹二升，大枣三十枚，生姜半斤，甘草五两，人参一两。上六味，以水一斗，煮取三升，温服一升，日三服。	陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮	生品	100.00g	上六味，以水2000mL，煮取600mL，温服200mL，日三服。	【功效】补虚清热，和胃降逆。 【主治】胃虚有热，胃气上逆证。症见呃逆，或干呕，或暖气。虚烦不安，少气，口干，手足心热，舌淡红或嫩红，苔少或薄白，脉虚细。
		竹茹	禾本科植物淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle 的茎秆的干燥中间层	生品	30.00g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	90.00g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	110.00g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	69.00g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	13.80g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升”“温服一升，日三服”，可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为：陈皮 33.33g、竹茹 10.00g、大枣 30.00g、生姜 36.67g、甘草 23.00g、人参 4.60g。根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(九) 甘姜苓术汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匱要略》(汉·张仲景)	甘草、白朮各二两,干姜、茯苓各四两。上四味,以水五升,煮取三升,分温三服。	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	27.60g	上四味,先以水1000mL煎煮四味,煮取约600mL,温服约200mL,日三服。	【功效】散寒除湿。 【主治】寒湿下侵之肾着。症见腰部冷痛沉重,饮食如故,小便自利,舌淡苔白,脉沉迟或沉缓。
		白朮	菊科植物白朮 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎	生品	27.60g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的干燥根茎	生品	55.20g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	55.20g		
备注	<p>据原方中煎煮法“煮取三升”“分温三服”,可知本方每服量为煎出总量的 1/3。故本方每次的服药量为:甘草 9.20g、白朮 9.20g、干姜 18.40g、茯苓 18.40g,根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点,日服用次数建议 1-3 次,根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算,若与当今主流用量严重不符,在固定原方比例和每服量的基础上,结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(十) 厚朴七物汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《金匮要略》 (汉·张仲景)	厚朴半斤，甘草、大黄各三两，大枣十枚，枳实五枚，桂枝二两，生姜五两。上七味，以水一斗，煮取四升，温服八合，日三服。	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	110.00g	上七味，以水2000mL煎煮，煮取800mL，温服160mL，日三服。	【功效】解肌发表，行气通便。 【主治】表虚里实证。症见腹满，便秘，发热恶寒，汗出，舌红苔薄黄，脉浮数或浮滑。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	41.40g		
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf.或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill.的干燥根及根茎	生品	41.40g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	30.00g		
		枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥幼果	生品	69.00g		
		桂枝	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝	生品	27.60g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	69.00g		
		备注	<p>据原方中煎煮法“煮取四升”“温服八合”“日三服”，可知本方每服量为煎出总量的1/5。故本方每次的服药量为：厚朴22.00g，甘草8.28g，大黄8.28g，大枣6.00g，枳实13.80g，桂枝5.52g，生姜13.80g，根据张仲景方剂服药法中“不必尽剂”、随证变化、灵活施用的特点，日服用次数建议1-3次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量严重不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>				

(十一) 温脾汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《备急千金要方》 (唐·孙思邈)	大黄四两，人参、甘草、干姜各二两，附子一枚（大者）。右五味，咬咀，以水八升煮取二升半，分三服。临熟下大黄。	大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf.或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill.的干燥根及根茎	生品	55.20g	上五味，以水1600mL，临熟下大黄，煮取500mL，日三服。	【功效】温补脾阳，攻下冷积。 【主治】脾阳不足，阴寒内积证。症见久利赤白，或霍乱；大便不通，脐腹冷痛，喜温不喜按，肢冷，舌淡苔白，脉沉弦或迟或弱。
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	27.60g		
		干姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的干燥根茎	生品	27.60g		
		附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx.子根的加工品	黑顺片	15.00g		
备注	<p>唐代方药计量传承了汉代的度量衡制度，服法亦参考汉代方剂处理。据原方中煎服法“煮取二升半，分三服”，可知本方每服剂量为煎出总量的 1/3，故本方每次的服药量为：大黄 18.40g，人参 9.20g，甘草 9.20g，干姜 9.20g，黑顺片 5.00g。日服用次数建议 1-3 次，根据临床实际遵医嘱使用。</p> <p>上述折算剂量系依汉代度量衡直接折算，若与当今主流用量不符，在固定原方比例和每服量的基础上，结合安全性评价结果及临床用药实际确定日服总量。</p>						

(十二) 竹茹汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《普济本事方》（宋·许叔微）	干葛三两，甘草三分（炙），半夏三分（姜汁半盞，浆水一升煮耗半）。右粗末，每服五钱，水二盞，生姜三片，竹茹一弹大，枣一个，同煎至一盞，去滓温服。	葛根	豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 或甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth.的干燥根	生品	123.90g	上药粉碎为粗粒，每服20.65g，以水600mL，生姜3.00g，竹茹1.00g，大枣3.00g，煮取300mL，去药渣温服。	【功效】清热和胃止呕。 【主治】胃中积热，失于和降之呕吐。症见食入即呕，吐物酸腐，口有秽气，躁闷心烦，渴喜冷饮，舌红苔黄腻，脉洪大。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	30.98g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	姜半夏	30.98g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	3.00g		
		竹茹	禾本科植物淡竹 <i>Phyllostachys nigra</i> (Lodd.) Munro var. <i>henonis</i> (Mitf.) Stapf ex Rendle 的茎秆的干燥中间层	生品	1.00g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	3.00g		
备注	<p>1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为61.95g，各药的日服量折算如下：葛根41.30g，炒甘草10.33g，姜半夏10.33g，另加生姜9.00g，竹茹3.00g，大枣9.00g。</p> <p>2.炒甘草：参考2020年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p>						

(十三) 辛夷散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《严氏济生方》(宋·严用和)	辛夷仁、细辛(洗去土、叶)、藁本(去芦)、升麻、川芎、木通(去节)、防风(去芦)、羌活(去芦)、甘草(炙)、白芷各等分。右为细末,每服二钱。食后茶清调服。	辛夷	木兰科植物望春花 <i>Magnolia biondii</i> Pamp.或玉兰 <i>Magnolia denudata</i> Desr.除去苞片的干燥花蕾	辛夷仁	0.83g	上药粉碎为细末,每服8.26g,食后茶清调服。	【功效】疏散风寒,祛湿通窍。 【主治】外感风寒湿邪,清窍不利证,症见鼻内壅塞,涕出不已,或气息不通,不闻香臭,舌淡苔白,脉浮。
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq.的干燥根和根茎	生品	0.83g		
		藁本	伞形科植物藁本 <i>Ligusticum sinense</i> Oliv.或辽藁本 <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitag.的干燥根	生品	0.83g		
		升麻	毛茛科升麻属植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim.或升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.的干燥根茎	生品	0.83g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎	生品	0.83g		
		木通	木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.、白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd.的干燥藤茎	生品	0.83g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根	生品	0.83g		
		羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根	生品	0.83g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	0.83g		

		白芷	伞形科植物白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f.或杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根	生品	0.83g		
备注	<p>1.本方组成中并未明确说明用量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量为 24.78g。各药的日服量可折算如下：辛夷仁 2.49g，细辛 2.49g，藁本 2.49g，升麻 2.49g，川芎 2.49g，木通 2.49g，防风 2.49g，羌活 2.49g，炒甘草 2.49g，白芷 2.49g。</p> <p>2.辛夷仁：除去外层带毛苞片。</p> <p>3.炒甘草：参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p> <p>4.鉴于古代长期推崇四川等地所产升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.，建议人工栽培优先选择该基原。</p> <p>5.取茶叶用沸水第一次冲泡澄清数分钟后的清汁调服。</p>						

(十四) 实脾散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《严氏济生方》(宋·严用和)	厚朴(去皮,姜制,炒)、白术、木瓜(去瓢)、木香(不见火)、草果仁、大腹子、附子(炮、去皮脐)、白茯苓(去皮)、干姜(炮)各一两,甘草(炙)半两。右咬咀,每服四钱,水一盏半,生姜五片,枣子一枚,煎至七分,去滓温服,不拘时候。	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮	姜厚朴	41.30g	上药粉碎成粗粒,每服16.52g,以水450mL,加入生姜5.00g,大枣3.00g,煮取210mL,去药渣温服,不拘时候。	【功效】温阳健脾,行气利水。 【主治】脾肾阳虚,水气内停之阴水证。症见肢体浮肿,下半身肿甚,手足不温,口中不渴,胸腹胀满,大便溏薄,小便少而清,舌苔白腻,脉沉弦而迟。
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	41.30g		
		木瓜	蔷薇科植物贴梗海棠 <i>Chaenomeles speciosa</i> (Sweet) Nakai 的干燥近成熟果实	生品	41.30g		
		木香	菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne. 的干燥根	生品	41.30g		
		草果	姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实	草果仁	41.30g		
		槟榔	棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L. 的干燥成熟种子	生品	41.30g		
		附子	毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 子根的加工品	黑顺片	41.30g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的白色干燥菌核	生品	41.30g		
		炮姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 干燥根茎的炮制加工品	炮姜	41.30g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	20.65g		

		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	5.00g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	3.00g		
备注	<p>1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 49.56g，各药的日服量折算如下：姜厚朴 5.22g，白术 5.22g，木瓜 5.22g，木香 5.22g，草果仁 5.22g，槟榔 5.22g，黑顺片 5.22g，茯苓 5.22g，干姜 5.22g，炒甘草 2.61g，另加生姜 15.00g，大枣 9.00g。</p> <p>2.炒甘草：参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p>						

(十五) 甘露饮

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《太平惠民和剂局方》(宋·太平惠民和剂局)	枇杷叶(刷去毛)、干熟地黄(去土)、天门冬(去心,焙)、枳壳(去瓢,麸炒)、山茵陈(去梗)、生干地黄、麦门冬(去心,焙)、石斛(去芦)、甘草(炙)、黄芩。右等分,为末。每服二钱,水一盏,煎至七分,去滓温服,食后,临卧。小儿一服分两服,仍量岁数加减与之。	枇杷叶	蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.的干燥叶	生品	0.83g	上药粉碎为末,每服8.26g,以水300mL,煮取210mL,去药渣,饭后、睡前温服。小儿用量减半。	【功效】滋阴清热,利湿降气。 【主治】胃热阴虚,脾胃湿热证。症见牙宣口臭,口舌生疮,齿龈肿烂,甚则脓血;或赤目肿痛,咽喉肿痛,面肿,目睑垂重;或身面皆黄,肢体微肿,胸满气短,大便不调,小便黄涩;舌红或绛,苔黄腻或有裂纹,脉濡数或细数。
		熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根的炮制加工品	熟地黄(蒸法)	0.83g		
		天冬	百合科植物天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.的干燥块根	天冬(焙)	0.83g		
		枳壳	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥未成熟果实	麸炒枳壳	0.83g		
		茵陈	菊科植物滨蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit.或茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb.的干燥地上部分	生品	0.83g		
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	0.83g		
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根	麦冬(焙)	0.83g		
		石斛	兰科植物铁皮石斛 <i>Dendrobium officinale</i> Kimura et Migo 或霍山石斛 <i>Dendrobium huoshanense</i> C. Z. Tang et S. J. Cheng 的干燥茎	生品	0.83g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	0.83g		

		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	0.83g		
备注	<p>1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 24.78g，各药的日服量折算如下：枇杷叶 2.49g，熟地黄 2.49g，天冬 2.49g，枳壳 2.49g，茵陈 2.49g，地黄 2.49g，麦冬 2.49g，石斛 2.49g，炒甘草 2.49g，黄芩 2.49g。儿童用量减半。</p> <p>2.炒甘草：参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p> <p>3.麦冬传统去心，为历代所沿用，延续至今，如 1963 年版《中华人民共和国药典》麦冬炮制项内明确“润透后抽去心”，自 1977 年版《中华人民共和国药典》起不再要求去心。当前麦冬不同产地生产方式有较大区别，不同栽培年限所致性状、气味及内在成分含量均有差异，品质差异较大，栽培年限过短者中柱细小，有鉴于此，建议参考 2015 年版《浙江省中药炮制规范》所规定的浙麦冬饮片规格入药。</p> <p>4.本方中天冬、麦冬注明焙的操作，其目的为使药材质地酥脆，便于后续粉碎，因此建议尊重原方炮制方法，可参考 2005 年版《安徽省中药炮制规范》中的焙法进行炮制。</p>						

(十六) 华盖散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《太平惠民和剂局方》（宋·太平惠民和剂局）	紫苏子（炒）、赤茯苓（去皮）、桑白皮（炙）、陈皮（去白）、杏仁（去皮、尖，炒）、麻黄（去根、节）各一两，甘草（炙）半两。右七味为末。每服二钱，水一盞，煎至七分，去滓，食后温服。	紫苏子	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.的干燥成熟果实	炒紫苏子	41.30g	上药粉碎为末。每服8.26g，以水300mL，煮取210mL，去药渣，饭后温服。	【功效】宣肺解表，祛痰止咳。 【主治】素体痰多，风寒袭肺证。症见咳嗽气急，甚则喘促，喉中痰鸣，胸膈满闷，项背拘急，鼻塞声重，头昏目眩。舌苔薄白，脉浮或紧。
		赤茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 淡棕色、淡红色的干燥菌核	生品	41.30g		
		桑白皮	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥根皮	炙桑白皮	41.30g		
		橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮	生品	41.30g		
		苦杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L.的干燥成熟种子	炒苦杏仁	41.30g		
		麻黄	麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 的干燥草质茎	生品	41.30g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	20.65g		
备注	<p>1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 24.78g，各药的日服量折算如下：炒紫苏子 3.81g，赤茯苓 3.81g，炙桑白皮 3.81g，橘红 3.81g，炒苦杏仁 3.81g，麻黄 3.81g，炒甘草 1.91g。</p> <p>2.炒甘草：参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p> <p>3.炙桑白皮：《太平惠民和剂局方》中桑白皮炮制备注有炒、微炒、蜜炒、炙等多种表述，可见炒与炙不同，古代“炙”早期多指火上烤之意，后发展成为液体辅料如蜜、酒、醋、盐水、姜汁、竹沥等处理后拌炒，其中不注明具体何种辅料的则多为清水，如明代炙甘草即明确为清水蘸炒。有鉴于此，炙桑白皮参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将桑白皮原药材除去杂质，洗净，润透，切丝，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p>						

(十七) 三痹汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《妇人 大全良 方》(宋 ·陈自 明)	川续断、杜仲(去皮, 姜汁炒)、防风、桂心、细辛、人参、茯苓、当归、白芍药、甘草各一两, 秦艽、生地黄、川芎、川独活各半两, 黄芪、川牛膝各一两。右咬咀为末, 每服五钱。水二盏, 姜三片, 枣一枚, 煎至一盏, 去滓热服, 无时候, 但腹稍空腹。	续断	川续断科植物川续断 <i>Dipsacus asper</i> Wall. ex Henry 的干燥根	生品	41.30g	上药粉碎为粗粒, 每服20.65g, 以水600mL, 生姜3.00g, 大枣3.00g, 煮取300mL, 去药渣热服, 无时候, 但腹稍空腹。	【功效】益气活血, 祛风除湿。 【主治】痹症日久耗伤气血证。症见手足拘挛, 或肢节屈伸不利, 或麻木不仁, 舌淡苔白, 脉细或脉涩。
		杜仲	杜仲科植物杜仲 <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. 的干燥树皮	姜杜仲	41.30g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根	生品	41.30g		
		肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	生品	41.30g		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎	生品	41.30g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	41.30g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	41.30g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	酒当归	41.30g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	41.30g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	41.30g		

		秦艽	龙胆科植物秦艽 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall.的干燥根	生品	20.65g		
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	20.65g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎	生品	20.65g		
		独活	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根	生品	20.65g		
		黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge.的干燥根	蜜炙黄芪	41.30g		
		牛膝	苋科植物牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> Bl.的干燥根	酒牛膝	41.30g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	3.00g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	3.00g		
备注	<p>1. 本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 61.95g，各药的日服量折算如下：续断 4.43g，姜杜仲 4.43g，防风 4.43g，肉桂 4.43g，细辛 4.43g，人参 4.43g，茯苓 4.43g，酒当归 4.43g，白芍 4.43g，炒甘草 4.43g，秦艽 2.21g，地黄 2.21g，川芎 2.21g，独活 2.21g，蜜炙黄芪 4.43g，酒牛膝 4.43g，另加生姜 9.00g，大枣 9.00g。</p> <p>2. 鉴于《妇人大全良方》卷首之“辨识修制药物法度”总论性章节中提及诸多药物的炮制，涉及本方中当归：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》酒当归炮制规格；牛膝：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》酒牛膝炮制规格；甘草：参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥；黄芪：建议采用 2020 年版《中华人民共和国药典》炙黄芪（即蜜炙黄芪）规格；杜仲：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》炙法中的姜炙法进行炮制。</p>						

(十八) 清胃散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《兰室秘藏》(金·李东垣)	当归身、择细黄连、生地黄(酒制)各三分,牡丹皮五分,升麻一钱。上为细末,都作一服,水一盏半,煎至一盏,去滓,带冷服之。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	1.24g	上药粉碎为细末,每服9.92g,以水450mL,煮取300mL,去药渣,冷服。	【功效】清胃凉血。 【主治】胃火炽盛之牙痛。症见牙痛牵引头痛,面颊发热,牙齿喜冷恶热,或牙宣出血,牙龈红肿溃烂,或唇舌颊腮肿痛,或口臭,口疮,口干舌燥,舌红苔黄,脉滑数。
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao、云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎	生品	1.24g		
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	酒生地	1.24g		
		牡丹皮	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.的干燥根皮	生品	2.07g		
		升麻	毛茛科升麻属植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim.或升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.的干燥根茎	生品	4.13g		
备注	<p>1.本方直接折算剂量并非每日服量,结合方剂组成及每服量,按日服三次计算,则本方的日服总量约为29.76g,各药的日服量折算如下:当归3.72g、黄连3.72g、酒生地3.72g,牡丹皮6.21g,升麻12.39g。</p> <p>2.酒生地:建议参考2020年版《中华人民共和国药典》酒炙法进行炮制。</p> <p>3.鉴于古代长期推崇四川等地所产升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.,建议人工栽培优先选择该基原。</p>						

(十九) 圣愈汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《兰室秘藏》（金·李东垣）	生地黄、熟地黄、川芎、人参各三分，当归身、黄芪各五分。上咬咀，如麻豆大，都作一服。水二大盏，煎至一盏，去滓，稍热无时服。	地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	1.24g	上药粉碎成粗粒，每服9.10g，以水1200mL，煮取300mL，去药渣，稍热无时服。	【功效】补气养血。 【主治】气血亏虚证。症见心烦，睡卧不宁，或妇女月经先期而至，量多色淡，神疲乏力，面色无华，舌淡，苔薄白，脉细弱。
		熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根的炮制加工品	熟地黄（蒸法）	1.24g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎	生品	1.24g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	1.24g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.)Diels 的干燥主根	生品	2.07g		
		黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	生品	2.07g		
备注	本方直接折算剂量并非每日剂量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 27.30g，各药的日服量折算如下：地黄 3.72g，熟地黄 3.72g，川芎 3.72g，人参 3.72g，当归 6.21g、黄芪 6.21g。						

(二十) 乌药汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《兰室秘藏》(金·李东垣)	当归、甘草、木香各五钱，乌药一两，香附子二两(炒)。上咬咀，每服五钱，水二大盏，去滓，温服，食前。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	20.65g	上药粉碎为粗粒，每服20.65g，以水1200mL，煮取300mL，去药渣，饭前温服。	【功效】行气疏肝，调经止痛。 【主治】肝郁气滞之痛经。症见经前及经行时小腹胀痛，胀甚于痛，或连及胸胁、乳房胀痛；或经期延后，舌淡红，苔薄白，脉弦。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	20.65g		
		木香	菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne.的干燥根	生品	20.65g		
		乌药	樟科植物乌药 <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.的干燥块根	生品	41.30g		
		香附	莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L.的干燥根茎	炒香附	82.60g		
备注	<p>1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为61.95g，各药的日服量折算如下：当归6.88g，甘草6.88g，木香6.88g，乌药13.77g，炒香附27.54g。</p> <p>2.炒香附：参考2020年版《中华人民共和国药典》清炒法进行炮制。</p> <p>3.本方未注明煎煮剩余水量，参考圣愈汤将剩余水量定为一盏，即300mL。</p>						

(二十一) 大秦芎汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《素问病机气宜保命集》(金·刘完素)	秦芎三两, 甘草二两, 川芎二两, 当归二两, 白芍药二两, 细辛半两, 川羌活、防风、黄芩各一两, 石膏二两, 吴白芷一两, 白术一两, 生地黄一两, 熟地黄一两, 白茯苓一两, 川独活二两。右十六味, 剉, 每服一两, 水煎, 去渣, 温服, 无时。	秦芎	龙胆科植物秦芎 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall.的干燥根	生品	123.90g	上药粉碎成粗粒, 每服 41.30g, 水煎, 去渣, 温服, 无时。	【功效】祛风清热, 养血活血。 【主治】风邪初中经络证。症见口眼喎斜, 舌强不能言语, 手足不能运动, 或半身不遂, 肢体麻木, 苔白或黄, 脉浮数或弦细。
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	82.60g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort.的干燥根茎	生品	82.60g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	82.60g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	82.60g		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq.的干燥根和根茎	生品	20.65g		
		羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根	生品	41.30g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根	生品	41.30g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	41.30g		

		石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙（CaSO ₄ •2H ₂ O）	生品	82.60g		
		白芷	伞形科植物杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根	生品	41.30g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎	生品	41.30g		
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	41.30g		
		熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根的炮制加工品	熟地黄 (蒸法)	41.30g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的白色干燥菌核	生品	41.30g		
		独活	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim.f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根	生品	82.60g		
备注	本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 123.90g，各药的日服量折算如下：秦艽 15.82g，甘草 10.54g，川芎 10.54g，当归 10.54g，白芍 10.54g，细辛 2.64g，羌活 5.27g、防风 5.27g、黄芩 5.27g，石膏 10.54g，白芷 5.27g，白术 5.27g，地黄 5.27g，熟地黄 5.27g，茯苓 5.27g，独活 10.54g。						

(二十二) 三化汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《素问病机气宜保命集》(金·刘完素)	厚朴、大黄、枳实、羌活各等分。右剉如麻豆大，每服三两，水三升，煎至一升半，终日服之。以微利为度，无时。	厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	30.98g	上药粉碎成粗粒，每服123.90g，以水1800mL，煮取900mL，多次频服，以微利为度。	【功效】通腑泄热，祛风通络 【主治】中风中脏腑之便秘。症见二便不通，猝然昏仆、半身不遂、四肢不举、口噤不语，舌质暗红，苔黄腻，脉滑数。
		大黄	蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim.ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill.的干燥根及根茎	生品	30.98g		
		枳实	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L.及其栽培变种的干燥幼果	生品	30.98g		
		羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根	生品	30.98g		
备注	据原方中用法“终日服之”，则本方的日服总量为123.90g，各药的日服量折算如下：厚朴30.98g，大黄30.98g，枳实30.98g，羌活30.98g。						

(二十三) 桑白皮汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》 (明·张景岳)	桑白皮、半夏、苏子、杏仁、贝母、山栀、黄芩、黄连各八分。水二盅，姜三片，煎八分，温服。	桑白皮	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥根皮	生品	2.98g	用水 400mL，加生姜 3.00g，煎至 160mL 温服。	【功效】清热化痰，降气平喘。 【主治】痰热郁肺之喘证。症见喘咳气涌，胸部胀痛，痰多质黏色黄或夹血痰；伴胸中烦闷，身热有汗，口渴而喜冷饮；面赤咽干，尿赤便秘；舌质红，苔黄腻，脉滑数。
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	清半夏	2.98g		
		紫苏子	唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt.的干燥成熟果实	生品	2.98g		
		苦杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L.的干燥成熟种子	焯苦杏仁	2.98g		
		浙贝母	百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq.的干燥鳞茎	生品	2.98g		
		栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	生品	2.98g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	生品	2.98g		
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao、云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎	生品	2.98g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	3.00g		
备注	1.本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每次服用量，日服 3 次。 2.焯苦杏仁：即焯苦杏仁。						

(二十四) 暖肝煎

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《景岳全书》 (明·张景岳)	当归二、三钱，枸杞三钱，茯苓二钱，小茴香二钱，肉桂一、二钱，乌药二钱，沉香一钱，或木香亦可。水一盅半，加生姜三、五片，煎七分，食远温服。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	9.33g	以水 300mL，煮取 140mL，食远温服。	【功效】暖肝温肾，行气止痛。 【主治】肝肾不足，寒凝肝脉证。症见睾丸冷缩，或小腹疼痛，疝气疼痛，畏寒喜暖，舌淡苔白，脉沉迟。
		枸杞子	茄科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥成熟果实	生品	11.19g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	7.46g		
		小茴香	伞形科植物茴香 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. 的干燥成熟果实	生品	7.46g		
		肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	生品	5.60g		
		乌药	樟科植物乌药 <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm. 的干燥块根	生品	7.46g		
		沉香	瑞香科植物白木香 <i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg 含有树脂的木材	生品	3.73g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	生品	4.00g		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议结合临床实际，日 1~3 剂遵医嘱使用。						

(二十五) 托里消毒散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《外科正宗》 (明·陈实功)	人参、川芎、白芍、黄芪、当归、白术、茯苓、金银花各一钱，白芷、甘草、皂角针、桔梗各五分。水二盅，煎八分，食远服。	人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎	生品	3.73g	以水 400mL，煮取 160mL，食远服。	【功效】益气养血，托毒生肌。 【主治】气血两虚之痈疽。症见脓水稀薄，疮面新肉不生，色淡红而不鲜或暗红，愈合缓慢，或伴面色无华，神疲乏力，纳少，舌质淡胖，苔少，脉沉细无力。
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎	生品	3.73g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	3.73g		
		黄芪	豆科植物蒙古黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. var. <i>mongholicus</i> (Bge.) Hsiao 或膜荚黄芪 <i>Astragalus membranaceus</i> (Fisch.) Bge. 的干燥根	生品	3.73g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	3.73g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. 的干燥根茎	生品	3.73g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核	生品	3.73g		
		金银花	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥花蕾或带初开的花	生品	3.73g		
		白芷	伞形科植物白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et	生品	1.87g		

			Yuan 的干燥根				
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	1.87g		
		皂角刺	豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 的干燥棘刺	生品	1.87g		
		桔梗	桔梗科植物桔梗 <i>Platycodon grandiflorum</i> (Jacq.) A. DC. 的干燥根	生品	1.87g		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每次服用量，日服 3 次。						

(二十六) 清上蠲痛汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《寿世保元》（明·龚廷贤）	当归一钱（酒洗），小川芎一钱，白芷一钱，细辛三分，羌活一钱，独活一钱，防风一钱，菊花五分，蔓荆子五分，苍术一钱（米泔浸），片苓一钱五分（酒炒），麦门冬一钱，甘草三分（生）。上锉一剂，生姜煎服。	当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	酒当归	3.73g	加 生 姜 3.00g，水煎服。	【功效】疏风散邪，清热止痛。 【主治】风邪上扰之头痛。症见头痛、发热、恶风，舌苔薄黄，脉浮数。
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎	生品	3.73g		
		白芷	伞形科植物白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. 或杭白芷 <i>Angelica dahurica</i> (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f. var. <i>formosana</i> (Boiss.) Shan et Yuan 的干燥根	生品	3.73g		
		细辛	马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎	生品	1.12g		
		羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根	生品	3.73g		
		独活	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根	生品	3.73g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根	生品	3.73g		
		菊花	菊科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat. 的干燥头状花序	生品	1.87g		
		蔓荆子	马鞭草科植物单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. var. <i>simplicifolia</i> Cham. 或蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. 的干	生品	1.87g		

			燥成熟果实				
		苍术	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz. 的干燥根茎	米泔水制苍术	3.73g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	酒黄芩	5.60g		
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl. 的干燥块根	生品	3.73g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	生品	1.12g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的新鲜根茎	生品	3.00g		
备注	<p>1.原文未注明生姜用量，结合原方剂量，建议生姜用量为 3.00g。</p> <p>2.本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每次服用量，日服 3 次。</p> <p>3.米泔水制苍术：参考 2020 年版《吉林省中药饮片炮制规范》中“米泔水制苍术”炮制方法进行炮制，以大米作为米泔水制作的原料。</p>						

(二十七) 养胃汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《证治准绳》 (明·王肯堂)	半夏(汤洗七次)、厚朴(去粗皮、姜汁炒)、苍术(米泔浸一宿,洗切,炒)各一两,橘红七钱半,藿香叶(洗去土)、草果(去皮膜)、茯苓(去黑皮)、人参(去芦)各半两,炙甘草二钱半。右咬咀,每服四钱,水一盏半,姜七片,乌梅一个,煎六分,热服。	半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	清半夏	37.30g	上药粉碎为粗粒,每服14.92g,加水450 mL,与生姜、乌梅共煎至180 mL。热服。	【功效】温中解表,调气养胃。 【主治】外感风寒,内伤生冷证。症见憎寒壮热,头目昏疼,肢体拘急,或胸满呕恶、不思饮食,舌淡苔白或腻,脉弦迟。
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	姜厚朴	37.30g		
		苍术	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC.或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz.的干燥根茎	米泔水制苍术	37.30g		
		橘红	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥外层果皮	生品	27.98g		
		广藿香	唇形科植物广藿香 <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth.的干燥叶片	生品	18.65g		
		草果	姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire 的干燥成熟果实	草果仁	18.65g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的白色干燥菌核	生品	18.65g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	18.65g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	9.33g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	7.00g		
乌梅	蔷薇科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb. et Zucc.的干燥近成熟果实	生品	2.65g				
备注	1.本方直接折算剂量并非每日剂量,结合方剂组成及每剂量,按日服三次计算,则本方的日服总量约为 44.76g,各药的日剂量折算如下:米						

泔水苍术 7.46g, 姜厚朴 7.46g, 清半夏 7.46g, 橘红 5.60g, 藿香 3.73g, 草果仁 3.73g, 茯苓 3.73g, 人参 3.73g, 炒甘草 1.87g, 另加生姜 21.00g, 乌梅 7.95g。

2.炒甘草：参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。

3.米泔水制苍术：参考 2020 年版《吉林省中药饮片炮制规范》中“米泔水制苍术”炮制方法进行炮制，以大米作为米泔水制作的原料。

(二十八) 石决明散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《普济方》 (明·朱橚)	石决明、羌活（去芦头）、草决明、菊花各一两，甘草（炙，剉）半两。右为散，每服二钱，以水一盏。煎六分，和滓，食后、临卧温服。	石决明	杂色鲍 <i>Haliotis diversicolor</i> Reeve 或皱纹盘鲍 <i>Haliotis discus hannai</i> Ino 的贝壳	生品	37.30g	上药捣碎为散，每服7.46g，加水300mL，煎至180mL，饭后、睡前温服。	【功效】疏散风热，清肝明目。 【主治】肝经风热证。症见视物不清，头目不利，或伴有口苦咽干，急躁易怒，便结溲黄；舌红，苔黄，脉弦。
		羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根	生品	37.30g		
		决明子	豆科植物钝叶决明 <i>Cassia obtusifolia</i> L.或决明（小决明） <i>Cassia tora</i> L.的干燥成熟种子	生品	37.30g		
		菊花	菊科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat.的干燥头状花序	生品	37.30g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	18.65g		
备注	<p>1.本方直接折算剂量并非每日服量，结合方剂组成及每服量，按日服三次计算，则本方的日服总量约为 22.38g，各药的日服量折算如下：石决明 4.97g，羌活 4.97g，决明子 4.97g，菊花 4.97g，炒甘草 2.49g。</p> <p>2.炒甘草：参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。</p>						

(二十九) 三甲复脉汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《温病条辨》 (清·吴瑭)	炙甘草六钱,干地黄六钱,生白芍六钱,麦冬五钱(不去心),阿胶三钱,麻仁三钱,生牡蛎五钱,生鳖甲八钱,生龟板一两。水八杯,煮取八分三杯,分三次服。	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	炒甘草	22.38g	加水 1600mL,煎至 480mL,日三服。	【功效】滋阴复脉,潜阳息风。 【主治】肝肾阴虚,阴虚动风证。症见心悸怔忡,甚或心痛,手足蠕动、抽搐;或见昼凉夜热,干咳或不咳,甚则瘛厥,口干舌燥,舌红少苔,脉细数。
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	22.38g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	生品	22.38g		
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根	生品	18.65g		
		阿胶	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L.的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶	生品	11.19g		
		火麻仁	桑科植物大麻 <i>Cannabis sativa</i> L.的干燥成熟种子	生品	11.19g		
		牡蛎	牡蛎科动物长牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg、大连湾牡蛎 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse 或近江牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的贝壳	生品	18.65g		
		鳖甲	鳖科动物鳖 <i>Trionyx sinensis</i> Wiegmann 的背甲	生品	29.84g		
		龟板	龟科动物乌龟 <i>Chinemys reevesii</i> (Gray)的背甲及腹甲	生品	37.30g		
备注	炒甘草: 参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法, 建议将甘草原药材除去杂质, 洗净, 润透, 切厚片, 趁湿清炒, 炒至微黄, 干燥。						

(三十) 新加香薷饮

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《温病条辨》 (清·吴塘)	香薷二钱，银花三钱， 鲜扁豆花三钱，厚朴二 钱，连翘二钱。水五杯， 煮取二杯，先服一杯， 得汗止后服，不汗再 服，服尽不汗，再作服。	香薷	唇形科植物石香薷 <i>Mosla chinensis</i> Maxim. 或江香薷 <i>Mosla chinensis</i> 'Jiangxiangru'的干燥地上部分	生品	7.46g	加水 1000mL， 煎煮至 400mL， 先服用 200mL， 汗出后停药，未 汗出再服，以汗 出为度。	【功效】祛暑解表， 清热化湿。 【主治】暑温夹湿， 复感于寒证。症见 发热头痛，恶寒无 汗，口渴面赤，胸 闷不舒，舌苔白腻， 脉浮而数。
		金银花	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb.的干燥花蕾或带初开的花	生品	11.19g		
		扁豆花	豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L.的 新鲜花	鲜品	11.19g		
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia</i> <i>officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝 皮	生品	7.46g		
		连翘	木犀科植物连翘 <i>Forsythia suspensa</i> (Thunb.) Vahl 的干燥果实	生品	7.46g		
备注							

(三十一) 桑杏汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《温病条辨》 (清·吴塘)	桑叶一钱, 杏仁一钱五分, 沙参二钱, 象贝一钱, 香豉一钱, 梔皮一钱, 梨皮一钱。水二杯, 煮取一杯, 顿服之, 重者再作服。	桑叶	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥叶	生品	3.73g	以水 400mL, 煮取 200mL, 顿服。	【功效】清宣温燥, 润肺止咳。 【主治】外感温燥证。症见头痛, 身热不甚, 微恶风寒, 口渴, 咽干鼻燥, 干咳无痰或痰少而黏, 舌红, 苔薄白而干, 脉浮数而右脉大。
		苦杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L.的干燥成熟种子	燀苦杏仁	5.60g		
		南沙参	桔梗科植物轮叶沙参 <i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunb.) Fisch. 或沙参 <i>Adenophora stricta</i> Miq.的干燥根	生品	7.46g		
		浙贝母	百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq.的干燥鳞茎	生品	3.73g		
		淡豆豉	豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr.的成熟种子(黑豆)的发酵加工品	生品	3.73g		
		梔子	茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果皮	生品	3.73g		
		梨皮	蔷薇科植物白梨 <i>Pyrus bretschneideri</i> Rehd.、沙梨 <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm. f.) Nakai 或秋子梨 <i>Pyrus ussuriensis</i> Maxim.的干燥果皮	生品	3.73g		
备注	1.梨皮基原系参考 2018 年版《湖北省中药材质量标准》中相关规定。 2.本方是单次服用, 日服 1-2 次。 3.燀苦杏仁: 即燀苦杏仁。						

(三十二) 益胃汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《温病条辨》（清·吴塘）	沙参三钱，麦冬五钱，冰糖一钱，细生地五钱，玉竹一钱五分（炒香）。水五杯，煮取二杯，分二次服，渣再煮一杯服。	南沙参	桔梗科植物轮叶沙参 <i>Adenophora tetraphylla</i> (Thunb.) Fisch. 或沙参 <i>Adenophora stricta</i> Miq.的干燥根	生品	11.19g	以水 1000mL，煮取 400mL；余渣另加水 500mL，煮取 200mL。	【功效】养阴益胃。 【主治】胃阴虚证。症见胃脘灼热隐痛，饥不欲食，口干咽燥，大便秘结，或干呕、呃逆，舌红少津，脉细数。
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根	生品	18.65g		
		冰糖	砂糖经再溶、洗净处理和重结晶而制得大颗粒结晶糖	生品	3.73g		
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	18.65g		
		玉竹	百合科植物玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce 的干燥根茎	炒玉竹	5.60g		
备注	1.建议将两次煎取所得药液混合，分 3 次服。 2.炒玉竹：参考 2020 年版《中华人民共和国药典》清炒法进行炮制。						

(三十三) 蠲痹汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医学心悟》 (清·程国彭)	羌活、独活各一钱，桂心五分，秦艽一钱，当归三钱，川芎七分，甘草五分(炙)，海风藤二钱，桑枝三钱，乳香、木香各八分。水煎服。	羌活	伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 的干燥根茎和根	生品	3.73g	水煎服。	【功效】祛风除湿，散寒止痛。 【主治】风寒湿痹证。症见肢体关节、肌肉疼痛，或游走不定，或遇寒加重，得热痛缓，或肢体关节酸楚、重着，或肌肤麻木不仁，关节屈伸不利，舌淡苔薄白或腻，脉弦紧或濡缓。
		独活	伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根	生品	3.73g		
		肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	生品	1.87g		
		秦艽	龙胆科植物秦艽 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall. 的干燥根	生品	3.73g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	11.19g		
		川芎	伞形科植物川芎 <i>Ligusticum chuanxiong</i> Hort. 的干燥根茎	生品	2.61g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch. 的干燥根和根茎	炒甘草	1.87g		
		海风藤	胡椒科植物风藤 <i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi 的干燥藤茎	生品	7.46g		
		桑枝	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥嫩枝	生品	11.19g		
		乳香	橄榄科植物乳香树 <i>Boswellia carterii</i> Birdw. 树皮渗出的树脂	生品	2.98g		
		木香	菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne. 的干燥根	生品	2.98g		
备注	1.本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每日服用量，分3次服。 2.炒甘草：参考2020年版《中华人民共和国药典》中清炒法，建议将甘草原药材除去杂质，洗净，润透，切厚片，趁湿清炒，炒至微黄，干燥。						

(三十四) 藿朴夏苓汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医原》 (清·石寿棠)	杜藿香二钱，真川朴一钱，姜半夏钱半，赤苓三钱，光杏仁三钱，生薏仁四钱，白蔻末六分，猪苓钱半，淡香豉三钱，建泽泻钱半。选用丝通草三钱，或五钱煎汤代水，煎上药服。	土藿香	唇形科植物藿香 <i>Agastache rugosa</i> (Fisch. et Mey.) O.Ktze 的干燥地上部分	生品	7.46g	以通草14.92g煎汤代水，入余药煎服。	【功效】宣通气机，解表化湿。 【主治】湿温初起，湿重热轻证。症见身热恶寒，肢体倦怠，胸闷口腻，面垢，或嗜睡，舌苔白或腻，脉濡缓。
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	生品	3.73g		
		半夏	天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.的干燥块茎	姜半夏	5.60g		
		赤茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 呈淡棕色、淡红色的干燥菌核	生品	11.19g		
		苦杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L.的干燥成熟种子	燀苦杏仁	11.19g		
		薏苡仁	禾本科植物薏米 <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>ma-yuen</i> (Roman.) Stapf 的干燥成熟种仁	生品	14.92g		
		豆蔻	姜科植物白豆蔻 <i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep.或爪哇白豆蔻 <i>Amomum compactum</i> Soland ex Maton 的干燥成熟果实	生品	2.24g		
		猪苓	多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries 的干燥菌核	生品	5.60g		
		淡豆豉	豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr.的干燥成熟种子(黑豆)的发酵加工品	生品	11.19g		
		泽泻	泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientate</i> (Sam.) Juzep.的干燥块茎	生品	5.60g		
通草	五加科植物通脱木 <i>Tetrapanax papyrifer</i> (Hook.) K. Koch 的干燥茎髓	生品	14.92g				

备注	<ol style="list-style-type: none">1.本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每日服用量，分3次服。2.土藿香：参考2015年版《浙江省中药炮制规格》收录的土藿香饮片规格。3.燂苦杏仁：即焯苦杏仁。
----	---

(三十五) 丁香柿蒂散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《伤寒瘟疫条辨》（清·杨栗山）	丁香、柿蒂各二钱，人参一钱，生姜三钱。水煎温服。	丁香	桃金娘科植物丁香 <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb.的干燥花蕾	生品	7.46g	水煎温服。	【功效】温中益气，降逆止呃。 【主治】胃气虚寒之呃逆。症见呃逆不止，胸脘痞闷，舌淡苔白，脉沉迟。
		柿蒂	柿树科植物柿 <i>Diospyros kaki</i> Thunb.的干燥宿萼	生品	7.46g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	3.73g		
		生姜	姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc.的新鲜根茎	生品	11.19g		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每日服用量，分3次服。						

(三十六) 清经散

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《傅青主女科》（清·傅山）	丹皮三钱，地骨皮五钱，白芍三钱（酒炒），大熟地三钱（九蒸），青蒿二钱，白茯苓一钱，黄柏五分（盐水浸，炒）。水煎服。	牡丹皮	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.的干燥根皮	生品	11.19g	水煎服。	【功效】清热养阴，凉血调经。 【主治】阴虚火旺之月经先期。症见月经先期量多，色深红或紫，质黏稠，或伴心烦，面红口干，小便短黄，大便燥结，舌红，苔黄，脉弦细数。
		地骨皮	茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill.的干燥根皮	生品	18.65g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	酒白芍	11.19g		
		熟地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.根茎的炮制加工品	熟地黄（蒸法）	11.19g		
		青蒿	菊科植物黄花蒿 <i>Artemisia annua</i> L.的干燥地上部分	生品	7.46g		
		茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的白色干燥菌核	生品	3.73g		
		黄柏	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid.的干燥树皮	盐黄柏	1.87g		
备注	本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每日服用量，分3次服。						

(三十七) 清肝止淋汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《傅青主女科》(清·傅山)	白芍一两(醋炒), 当归一两(酒洗), 生地五钱(酒炒), 阿胶三钱(白面炒), 粉丹皮三钱, 黄柏二钱, 牛膝二钱, 香附一钱(酒炒), 红枣十个, 小黑豆一两。水煎服。	白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	醋白芍	37.30g	水煎服。	【功效】养血柔肝, 清热化湿。 【主治】肝旺脾虚, 湿热下注证。症见带下色红, 淋漓不断, 或见经间期出血, 色深红质稠, 舌红苔黄腻, 脉滑数。
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	酒当归	37.30g		
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	酒生地	18.65g		
		阿胶	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L.的皮经煎煮、浓缩制成的固体胶	白面炒阿胶	11.19g		
		牡丹皮	毛茛科植物牡丹 <i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.的干燥根皮	生品	11.19g		
		黄柏	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid.的干燥树皮	生品	7.46g		
		牛膝	苋科植物牛膝 <i>Achyranthes bidentata</i> Bl.的干燥根	生品	7.46g		
		香附	莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L.的干燥根茎	酒香附	3.73g		
		大枣	鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill.的干燥成熟果实	生品	30.00g		
		小黑豆	豆科植物野大豆 <i>Glycine soja</i> Sieb. et Zucc 的干燥成熟种子	生品	37.30g		
备注	<p>1.鉴于古代“酒洗”、“酒炒”炮制方法演变到现代, 与“酒炙”法内涵基本一致, 建议采用酒炙法。酒生地、酒香附: 建议参考2020年版《中华人民共和国药典》酒炙法进行炮制。</p> <p>2.醋白芍: 建议参考2020年版《中华人民共和国药典》醋炙法进行炮制。</p> <p>3.白面炒阿胶: 建议参考2020年版《中华人民共和国药典》炒法, 以白面粉为辅料进行炮制。</p> <p>4.小黑豆: 建议参考1986年版《浙江省中药炮制规范》收录的“野大豆”规格。</p> <p>5.本方原文未明确是日服量还是单次服量, 建议将原方剂量作为每日服用量, 分3次服。</p>						

(三十八) 两地汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《傅青主女科》 (清·傅山)	大生地一两(酒炒), 元参一两,白芍药五钱 (酒炒),麦冬肉五钱, 地骨皮三钱,阿胶三 钱。水煎服。	地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	酒生地	37.30g	水煎服。	【功效】养阴清 热,凉血调经。 【主治】阴虚血热 之月经先期。症见 经来先期,量少或 量多,色红质稠, 或见两颧潮红,手 足心热,咽干口 燥,舌红少苔,脉 细数。
		玄参	玄参科植物玄参 <i>Scrophularia</i> <i>ningpoensis</i> Hemsl.的干燥根	生品	37.30g		
		白芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall.的干燥根	酒白芍	18.65g		
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根	生品	18.65g		
		地骨皮	茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill.的 干燥根皮	生品	11.19g		
		阿胶	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L.的干燥皮 或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶	生品	11.19g		
备注	1.酒生地:建议参考2020年版《中华人民共和国药典》酒炙法进行炮制。 2.本方原文未明确是日剂量还是单次剂量,建议将原方剂量作为每日服用量,分3次服。						

(三十九) 四妙勇安汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《验方新编》 (清·鲍相璈)	金银花、元参各三两， 当归二两，甘草一两。 水煎服。	金银花	忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb.的干燥花蕾或带初开的花	生品	111.90g	水煎服。	【功效】清热解毒，活血止痛。 【主治】热毒炽盛之脱疽。症见患肢暗红微肿，灼热疼痛，久则溃烂，甚则脚趾节节脱落、延及足背，发热口渴，舌红脉数。
		玄参	玄参科植物玄参 <i>Scrophularia ningpoensis</i> Hemsl.的干燥根	生品	111.90g		
		当归	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥根	生品	74.60g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	37.30g		
备注	本方原文未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每日服用量，分3次服。						

(四十) 除湿胃苓汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医宗金鉴》 (清·吴谦)	苍术(炒)、厚朴(姜炒)、陈皮、猪苓、泽泻、赤茯苓、白术(土炒)、滑石、防风、山栀子(生,研)、木通各一钱,肉桂、甘草(生)各三分。水二盅,灯心五十寸,煎八分,食前服。	苍术	菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.)DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.)Koidz.的干燥根茎	麸炒苍术	3.73g	以水 400mL, 加灯心草 0.15g, 煎至 160 mL, 饭前服用。	【功效】健脾利湿, 清热止痒。 【主治】脾肺湿热之蛇串疮。症见簇集性水疱, 色黄白, 大小不等, 糜烂疼痛流水, 舌红苔黄腻, 脉滑数。
		厚朴	木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils.的干燥干皮、根皮及枝皮	姜厚朴	3.73g		
		陈皮	芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮	生品	3.73g		
		猪苓	多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.)Fries 的干燥菌核	生品	3.73g		
		泽泻	泽泻科植物东方泽泻 <i>Alisma orientate</i> (Sam.) Juzep. 或泽泻 <i>Alisma plantago-aquatica</i> Linn.的干燥块茎	生品	3.73g		
		赤茯苓	多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.)Wolf 呈淡棕色、淡红色的干燥菌核	生品	3.73g		
		白术	菊科植物白术 <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz.的干燥根茎	土炒白术	3.73g		
		滑石	硅酸盐类矿物滑石族滑石, 主含含水硅酸镁[Mg ₃ (Si ₄ O ₁₀)(OH) ₂]	生品	3.73g		
		防风	伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk.的干燥根	生品	3.73g		

	栀子	茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实	生品	3.73g		
	木通	木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.、白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd.的干燥藤茎	生品	3.73g		
	肉桂	樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮	生品	1.12g		
	甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	1.12g		
	灯心草	灯心草科植物灯心草 <i>Juncus effusus</i> L.的干燥茎髓	生品	0.15g		
备注	<p>1.本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每次服用量，日服3次。</p> <p>2.土炒白术：建议参考1988年版《全国中药饮片炮制规范》土炒白术方法进行炮制。</p>					

(四十一) 黄连膏

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医宗金鉴》 (清·吴谦)	黄连三钱，当归尾五钱，生地一两，黄柏三钱，姜黄三钱。香油十二两，将药燥枯，捞去渣；下黄蜡四两溶化尽，用夏布将油滤净，倾入磁碗内，以柳枝不时搅之，候凝为度。	黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao、云连 <i>Coptis teeta</i> Wall.的干燥根茎	生品	11.19g	用麻油447.6g炸诸药至枯，捞去渣；黄蜡149.2g溶化尽，将油滤净，倾入瓷瓶内，搅至凝结。将膏匀涂于患处。	【功效】清热润燥，解毒止痛。 【主治】热毒壅滞证。症见痈疽疮疔，局部红肿热痛，干燥瘙痒，舌红苔黄，脉数。
		当归尾	伞形科植物当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥支根	生品	18.65g		
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch.的干燥块根	生品	37.30g		
		黄柏	芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid.的干燥树皮	生品	11.19g		
		姜黄	姜科植物姜黄 <i>Curcuma longa</i> L.的干燥根茎	生品	11.19g		
		麻油	脂麻科植物脂麻 <i>Sesamum indicum</i> L.的成熟种子用压榨法得到的脂肪油	—	447.60g		
		蜂蜡	蜜蜂科昆虫中华蜜蜂 <i>Apis cerana</i> Fadricius 分泌的蜡质精制而成	—	149.20g		
备注							

(四十二) 清燥救肺汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《医门法律》 (清·喻嘉言)	桑叶三钱（去枝梗），石膏二钱五分（煨），甘草一钱，人参七分，胡麻仁一钱（炒，研），真阿胶八分，麦门冬一钱二分（去心），杏仁七分（炮，去皮尖，炒黄），枇杷叶一片（刷去毛，蜜涂炙黄）。水一碗，煎六分，频频二、三次滚热服。	桑叶	桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥叶	生品	11.19g	以水 300mL，煎至 180mL，热服。	【功效】清燥润肺，益气养阴。 【主治】温燥伤肺，气阴两伤证。身热头痛，干咳无痰，气逆而喘，咽喉干燥，鼻燥，心烦口渴，胸满胁痛，舌干少苔，脉虚大而数。
		石膏	硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙（CaSO ₄ ·2H ₂ O）	煨石膏	9.33g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	3.73g		
		人参	五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey.的干燥根和根茎	生品	2.61g		
		黑芝麻	脂麻科植物脂麻 <i>Sesamum indicum</i> L.的干燥成熟种子	炒黑芝麻	3.73g		
		阿胶	马科动物驴 <i>Equus asinus</i> L.的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶	生品	2.98g		
		麦冬	百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl.的干燥块根	生品	4.48g		
		苦杏仁	蔷薇科植物杏 <i>Prunus armeniaca</i> L.的干燥成熟种子	炒苦杏仁	2.61g		
		枇杷叶	蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.的干燥叶	蜜枇杷叶	3.73g		
备注	<p>1.本方未明确是日服量还是单次服量，建议将原方剂量作为每次服用量，日服3次。</p> <p>2.麦冬传统去心，为历代所沿用，延续至今，如1963年版《中华人民共和国药典》麦冬炮制项内明确“润透后抽去心”，自1977年版《中华人民共和国药典》起不再要求去心。当前麦冬不同产地生产方式有较大区别，不同栽培年限所致性状、气味及内在成分含量均有差异，品质差异较大，栽培年限过短者中柱细小，有鉴于此，建议参考2015年版《浙江省中药炮制规范》所规定的浙麦冬饮片规格入药。</p>						

(四十三) 凉血地黄汤

基本信息		现代对应情况					
出处	处方、制法及用法	药味名称	基原及用药部位	炮制规格	折算剂量	用法用量	功能主治
《外科大成》 (清·祁坤)	归尾一钱五分，生地二钱，赤芍一钱，黄连（炒）二钱，枳壳一钱，黄芩一钱（炒黑），槐角三钱（炒黑），地榆二钱（炒黑），荆芥一钱（炒黑），升麻五分，天花粉八分，甘草五分。右一剂。加生侧柏二钱，用水二大盅，煎一盅，空心服三、四剂，则痛止肿消，更外兼熏洗。	当归尾	伞形科当归 <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) Diels 的干燥支根	生品	5.60g	以水 400mL，煎至 200mL。空腹服用，每日三剂。	【功效】清热凉血止血。 【主治】血热肠燥证。症见肛周皮肤肿痛、便血、瘙痒，或见口渴、心烦、眠差，舌红苔黄，脉数。
		地黄	玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的干燥块根	生品	7.46g		
		赤芍	毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 的干燥根	生品	3.73g		
		黄连	毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C. Y. Cheng et Hsiao、云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎	炒黄连	7.46g		
		枳壳	芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实	生品	3.73g		
		黄芩	唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根	黄芩炭	3.73g		
		槐角	豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L. 的干燥成熟果实	槐角炭	11.19g		
		地榆	蔷薇科植物地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. 或长叶地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. var. <i>longifolia</i> (Bert.) Yü et Li 的干燥根	地榆炭	7.46g		
		荆芥炭	唇形科植物荆芥 <i>Schizonepeta tenuisfolia</i> Briq. 干燥地上部分的炮制加工品	荆芥炭	3.73g		
升麻	毛茛科升麻属植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻	生品	1.87g				

			<i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim.或升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L.的干燥根茎				
		天花粉	葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或 双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥根	生品	2.98g		
		甘草	豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.的干燥根和根茎	生品	1.87g		
		侧柏叶	柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.)Franco 的枝梢和叶	生品	7.46g		
备注	炒黄连：建议参考 2020 年版《中华人民共和国药典》中清炒法进行炮制。						

注：由于剂型和煎煮法不同，表中各药折算剂量与备注中的日服量可能存在差异（由小数点进位导致），建议以备注中各药的日服量折算结果进行研发。